

- SCHMIDT, K. (1987): Mehr Beachtung und Schutz den Brutdohlen Mitteleuropas. – Falke **34**: 151-159.
- SCHMIDT, K. (1988): Die Dohle (*Corvus monedula*) als Brutvogel im Bezirk Suhl (DDR) und erste Erfahrungen zum Schutz dieser gefährdeten Vogelart. – Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspf. Baden-Württemberg **53**: 191 - 210.
- SCHMIDT, K. & SCHMIDT, M. (1994): Zum Vorkommen und zur Brutbiologie der Dohle (*Corvus monedula*) in Südhüringen. – Naturschutzreport **7** (2): 326 - 336.
- SCHMIDT, K. (1999): In SW-Thüringen realisierte Schutzmaßnahmen für Dohlen *Corvus monedula* und deren Einfluß auf den Brutbestand dieser gefährdeten Vogelart. - Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **3**: 213 - 224.
- SCHMIDT, K. (2004): Vorkommen, Bestandssituation und Bruterfolg der Dohle, *Corvus monedula*, in Thüringen – Ergebnisse einer Bestandserfassung im Jahre 2002. – Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **5**: 67 - 76.
- TÖPFER, T. (1999): Veränderungen im Bestand und in der Brutplatzwahl der Dohle (*Corvus monedula*) in Dresden. – Mitt. Ver. Sächs. Orn. **8** (Sonderheft 2): 71 - 74.
- WEISS A. (1908): Die Fauna (Tierwelt). Abt.1 Vertebrata. In: Neue Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen. – Schr. Ver. Sachsen-Meiningische Geschichte u. Landeskunde. Hildburg hausen. **57** (Heft VII): 619 – 710

Klaus Schmidt

Liebensteiner Straße 1

36456 Barchfeld /Werra

e-mail: KlausSchmidt.B@gmx.de

NEUE LITERATUR

- ROST, F. (2005): Der Vogelbestand von Ackerterrassen im Thüringer Gebirge. - Landschaftspflege u. Naturschutz in Thüringen **42** (3): 104 - 107
 Vorgestellt werden Untersuchungsergebnisse auf zwei ehemaligen, heute aufgelassenen und teilweise verbuschten Ackerterrassen (13 und 25 ha) in Höhenlagen von 540 - 600 m bzw. 680 - 784 m ü. NN im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Untersuchungsfläche 1 ergab bei der mehrjährigen Erfassung Brutnachweise von 28, Fläche 2 im Jahr 2003 von 21 Arten. Die höchsten Abundanz- und Dominanzwerte erreichten Gartengrasmücke, Buchfink und Fitis.

D.v.Knorre, Jena